







ANNEE 1991 Derexia rose EMPLACEMENT & R3 1 121.125 MOM M Nbre Débourrement Nbre Ferti- Floraison Véraison yeux début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin Maturité Souche 163 1934 0 1 2 3 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C Pour : Mill : 1 Baie: TG - G - M - P Dim: 5 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : Vigueur :

Umatan dan bi

ANNET: 1994 EMPLACEMENT 8 R3 s 121. 125 WOM Serecia rose m. Whre Débourrement Mbre Ferti-Floraison Véraison yeux début mi/déb debut mi/f | lito debut mi/v fin Maturité grap fin 7.3 103. 0 1 X OX Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C Pour : Mill : OK Baie: TC - G - H - P Dim: 1 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré D & 10.3.94 (+3) Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : Vigueur :

ANDEE: 1995 EMPLACEMENT & R 3 A/21 .125 MCM Serenia rose ouche Nbre Débourrement yeux début mi/déb Hhre Véraison début mi/v Ferti-Floraison Maturité grap lité debut mi/f | fin mi/v fin 3.4. 30.3 0 1 X A Crappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C + Pour : Mill : \$ Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus 3.495(+17) Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Popins: avec - apyrène

Port: 
Vigueur: 2,5 Pépins : avec - apyrène

MOM Derescia nose

EMPLACEMENT PR3 121 -125

ob. 168.79.												
iche		Débourrement début mi/déb			Ferti- Floraison debut mi/f fin			Véraison début mi/v fin			Maturit <b>é</b>	
1	6	28.2	4.3	6								
3 X 5	o of of		.96(-9)			TG - disc-: r : B-C : s - : avec	Mil. sph-el Gr-Rs- m - a	l : - P D 1-ov- Rg-N r - f yrêne	im : obov-cy Jus ox - he	l-fus : inc		l, - i1 -C

Juntan landa Loutonhoutendontonloutenl

N° d'ordre :

Désignation :

Serescia rose

Emplacement :

Cl 8 R3 s 181-125 s 1-1

### (A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente 2/8)- sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages byonzées ou cuivrées 196) - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 188,

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etdles - en goutrière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranésuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente \$80 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210)entièrement bronzées ou cuivrées 2013 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, in couleur de la 22me et de la 32me feuille détachées sera notée).

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Fice inférioure

Vervures : glabre 2 (3) - séteux 2 (5 velouté 216 - aranéeux 217 duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 -

sans villosité laineuse 233 duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villesité pubescente 284 sans villosité laineuse 28(.)

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

## Pace supérieure

Blanc 226 - flauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jauno 230 - a plages bronsées ou cuivrées 231) - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte (33).

A pétiole glabre (3) - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 dureteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 91

N° d'ordre :

Amdondandia

Désignation : Emplacement :

Serexia

8 R3 1. 121. 125 s. 1

(me fansse for liver me faille

dontoologiaalaataalaataal

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - cotelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré 254) - à raies 255 - vert 256. Noeuds

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265. Bourgeon

### (I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : male 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

-Calvo 92

N° d'ordre :

Junimal matic

Seresera rose

8 R3 s. 121-125 (s.1)

FEUILLE ADULTE

FEUILLE ADULTE

THE JOURSE JAS

Désignation : Emplacement :

Petite 141 - moyenne 142/- grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

> limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté est Lobes : plan - en gouttière - involuté - revoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 -

plissée au point pétiolaire 161 light chrees au fund fétiolaire Nervures : Face supérieure : verte 163 point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

> Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

### PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172. Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178. Aranéeux 179 duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calvo 90

# Formulaire de description 5/8

(maturité)

Nom cépage: Sérexia rose

luntumluntia

Observateur LACOMBE

Emplacement 8 R3 s 121-125

duntanlantanlantankankantaal

### Grappe

oiv 202 longueur: très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm) 3 - moyenne (15-20cm) 3 - longue (20-30cm) 7 - très longue (>30cm) 9.

oiv 203 largeur: très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3 - moyenne (10-15cm) 3 - large (15-20cm) 7 - très large (>20cm) 9.

oiv 204 compacité: très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9.

oiv 206 longueur pédoncule: très court (<2cm) 1 - court (2-4cm) 3 - moyen (4-7cm) 5 - long (7-10cm) 7 - très long (>10cm) 9.

oiv 207 lignification du pédoncule: base seulement 1 - moitié 5 - plus de la moitié 7

oiv 208\* forme: cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2

oiv 209\* présence d'un aileron: absent 1 - une aile 2 deux ailes 3 - plus de deux ailes 4.

Baie oiv 220 longueur: très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5- longue (20-26mm) 7 - (rès longue (>26mm) 9. oiv 221 largeur: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5- large (20-26mm) 7 - très large (~26mm) 9. oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme 1 - uniforme 3 ory 223 forme aplatie (1 - arrondie (2) - elliptique 3 - ovoide 4 - troncovoide 5 - obovoide 6 ylindrique 7 - arquée 8. iv 225 couleur épiderme : vert jaune 1 - rose(2) rouge(3 - gris 4 - rouge viole (5 - bleu noir 6. iv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme2 onv 227 **pruine** nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5- forte 7 - très forte 9. oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 - épaisse 7 - tres épaisse 9. ow 229 ombilic : peu apparent ) - apparent 2 ory 230\* coloration de la pulpe : non coloree 1) coloree 2. oiv 231 intensité coloration pulpe non coloree D- coloration faible 3 - coloration moyenne 5 torte coloration 7 - très forte coloration 9. DIV 232 succulence pulpe : peu juteuse 1 - juteusé 2.) oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (>05) 3 - moyen (65-75) 5 élevé (>75) 7 oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5- élevée 7 - très elevee 9. oiv 236 saveur : aucune 1) goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbace 4 - goût spécial 5 oiv 236\* saveur: aucune 1- goût muscat 2 - goût foxe 3 - autre 4 oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3 - moyen (8-12mm) 5- long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9. oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3)- moyen 5 - difficile 7 - très difficile 9. oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3. oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9. Grunn oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) très faible (~10mg) + - faible (25mg) 3 moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (~65mg) 9. oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins absentes () - présentes 2

DENOMINATION: Seresia rose
EMPLACEMENT: 8 R 3 1 121.125 1.1

luntum antimi mi muner

## SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grale (1) - moyen (2) - fort (3). Sarment : ramifié (1) - peu ramifié (2)) : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2) Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) )- aplatie (3) autre (4). : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) côtelée (4). : pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3). : glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) 4 saillants (4). Noeuds : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron fonce (5) - brun rouge (6) - violace (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4) : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violace (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). ... : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). ; salllant (1) - effecé (2). : sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 91

nésignation : Seresia rose Emplacement : 8 R3 A121 - 125 -

Juntan hatik

```
Angle des nervures
Sexe
                                     : (7)-(8) - 9
Li1/L
                                     : (10) - (11)
                                    : 12 - 13 - (14) - 15 - 16
L2/L
Nombre de lobes
                                    : 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Sup.
                                     : 21 - (22) - (23) - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                                     : 25 - 26 - (27) - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
                                     : (267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : (30)
                                     : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
                                     : (271)
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                      : (40) - 41
Dents : forme
                                     : 42 - (43) - 44
Dents (angle)
                                     : 45 - 46 - 47
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): (18 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 59
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : 60 - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65
                                     : 63 - 64 - (65)- 66 - 67
 Largeur du sinus patiolaire
```

alantan lantan lantan dan dan dan dan landa

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remes 96